

PARAMETRI VITALI DEL GATTO

ANiFiT
ALL NATURAL



FREQUENZA CARDIACA | POLSO

- Il polso può essere misurato sull'arteria femorale (parte interna della coscia), come nel cane, ma può essere talvolta difficile.
- È più semplice percepire direttamente il battito cardiaco sulla parete toracica (all'altezza del gomito).
- Conta il polso/battito cardiaco per 15 secondi e moltiplica il risultato $\times 4$.
- Il risultato indica il numero di battiti cardiaci al minuto.

Gatto: 110–130 battiti al minuto (quando il gatto è rilassato)

Motivi di variazione: agitazione, stress di qualsiasi tipo, temperatura, malattie cardiache/polmonari o altro.



FREQUENZA RESPIRATORIA

- Controlla visivamente se il torace si solleva e si abbassa.
- Se non è possibile vederlo, appoggia delicatamente il palmo della mano sul torace e cerca di percepire il movimento.
- Conta i respiri per 1 minuto.

Frequenza respiratoria media: 20–40 respiri al minuto.

Variazioni: frequenza respiratoria aumentata o rallentata, respirazione addominale intensa o superficiale, presenza di rumori. Osserva attentamente il gatto e, se necessario, contatta il veterinario.

Ansimare è sempre un'emergenza, a meno che il gatto non abbia subito stress durante il trasporto o non sia stato a lungo a temperature elevate a giocare con altri gatti (gatti giovani).



TEMPERATURA

- La misurazione viene effettuata nell'ano (utilizza vaselina).
- La temperatura corporea varia in funzione della taglia e dell'età meno che nei cani.

Gatti adulti: 37,8 – 39,0 °C

Panoramica:

37,5°	37,5°–39°	39°–40°	40°–41°	da 41°	da 42°
Lieve ipotermia	Normale	Febbre / dopo attività fisica o agitazione	Febbre alta / pericolo di vita	pericolo di vita!	Pericolo di vita acuto



MUCOSE

- La mucosa sana è rosa tenue, lucida e umida.
- Cerca nella bocca zone non pigmentate (gengive, labbra).
- Nei gatti osserva anche il colore del naso.

Tempo di riempimento capillare (TRC):

- Premi brevemente un dito sulla mucosa (il sangue viene spinto fuori dai capillari).
- Togli il dito e osserva la zona.
- Se all'inizio la zona è bianca perché non contiene sangue, dopo due secondi dovrebbe tornare a essere ben rosa.

Se non è così:

- Pallida: anemia, debolezza circolatoria, shock.
- Rosso scuro: febbre, possibile malattia infettiva, setticemia (attenzione: infiammazione delle gengive).
- Bluastro: carenza di ossigeno.
- Giallastro: problemi al fegato o alla bile, malattia del sangue, malattia infettiva.
- Secca/appiccicosa: perdita di liquidi.

IMPORTANTE: in presenza di una di queste anomalie chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario!



CONTROLLARE L'EQUILIBRIO DEI LIQUIDI

- Solleva la pelle nella zona tra collo e spalle formando una piega.
- Lascia andare la piega: dovrebbe tornare immediatamente nella posizione normale. Se non lo fa, il gatto è disidratato.
- Se la piega torna un po' più lentamente nella posizione normale, assicurati che il gatto beva molto o assuma cibo umido.
- Se la piega torna molto lentamente o non torna affatto, chiedi consiglio al veterinario, perché il gatto potrebbe aver bisogno di un'infusione.



SINTOMI DI SHOCK

I seguenti sintomi di shock possono comparire singolarmente o in combinazione e possono avere intensità diverse:

Sintomi

- Il gatto appare debole e apatico.
- Movimenti incerti, andatura barcollante fino al collasso.
- Il gatto trema come se avesse freddo.
- Le zampe, le orecchie e la punta della coda sono fredde.
- Le mucose e il naso sono pallidi, il tempo di riempimento capillare è rallentato.
- Il battito cardiaco è accelerato, superficiale e irregolare.

IMPORTANTE: in caso di sospetto shock chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario: È IN PERICOLO DI VITA!



SINTOMI IN CASO DI INTOSSICAZIONE

I sintomi di un'intossicazione possono essere diversi e avere intensità variabile a seconda della sostanza tossica e della sua concentrazione.

Sintomi

- Ritiro, più raramente irrequietezza
- Salivazione eccessiva o vomito, spesso con consistenza schiumosa
- Diarrea
- Andatura barcollante, crampi
- Battito cardiaco irregolare
- Gengive e naso pallidi
- Difficoltà respiratorie
- Dimensione insolita delle pupille
- Sangue nelle urine e/o nelle feci

Sintomi del dolore

- Ritiro, nascondersi!
- Non ama essere toccato oppure è particolarmente affettuoso
- Non viene a mangiare come al solito
- Il gatto non salta più in alto come di consueto (ad es. su una sedia o un tavolo)
- Cura del pelo insufficiente o eccessiva
- Miagolio insolito e rumoroso

IMPORTANTE: in caso di sospetto di intossicazione chiama IMMEDIATAMENTE il veterinario!

- Il gatto non deve più muoversi e dovrebbe essere messo in un trasportino, in modo da limitare la diffusione della sostanza tossica.
- Entro due ore, nella maggior parte dei casi è possibile indurre il vomito nel gatto.

Che cosa deve sapere il veterinario

- Quale sostanza tossica ha ingerito il gatto?
- Quando ha ingerito la sostanza tossica?
- Quanto ne ha ingerito?
- Quali comportamenti anomali e quali sintomi presenta il gatto?

I PARAMETRI VITALI DEL MIO GATTO

Per poter riconoscere facilmente se il tuo gatto sta bene o se qualcosa non va, è importante conoscere i suoi parametri vitali. In questo documento ti abbiamo spiegato quali sono i parametri vitali e come misurarli.

Ora tocca a te:

Controlla i parametri vitali del tuo gatto utilizzando questo documento e annotali nella tabella qui sotto. All'inizio puoi ripetere il controllo ogni 1-2 mesi. Da un lato acquisirai sempre più pratica, dall'altro il tuo gatto si abituerà. In questo modo imparerai a conoscere al meglio il tuo amico felino e, in caso di emergenza, riconoscerai immediatamente eventuali variazioni dei parametri vitali.

Queste informazioni sono molto importanti e utili anche per il veterinario.

Ti auguriamo di divertirti a conoscere meglio il tuo gatto!

Il tuo team ANiFiT



NOME DEL GATTO: _____

PARAMETRO VITALE	DATA	VALORE MISURATO	OSSERVAZIONE
Respirazione			
Cuore / polso			
Tempo di riempimento capillare			
Mucosa orale			
Equilibrio dei liquidi, elasticità della pelle			
Temperatura corporea			
Stato di coscienza			
Fabbisogno di acqua potabile			